

Medicin til ADHD



| | Centralstimulerende [§] | | | Ikke centralstimulerende | |
|----------------------------------|---|--|---|---|---|
| Lægemiddel (Handelsnavn) | Methylphenidat (Ritalin, Concerta, Medikinet mf.) | Lisdexamfetamin (Elvanse, Aduvanz) | Dexamfetamin (Attentin) | Atomoxetin (Atomoxetin) | Guanfacin (Inutuniv, Paxneury) |
| Rationale for valg af lægemiddel | Førstevalg | | | Som førstevalg ved samtidig: ● Risiko for misbrug | Ved markant øget puls eller blodtryk på de andre ADHD lægemidler. |
| | Ligeværdige andetvalg Atomoxetin er det billigste af disse lægemidler og skal derfor som udgangspunkt forsøges, før der kan bevilges enkelttilskud til dexamfetamin eller lisdexamfetamin eller der skal angives en årsag til, hvorfor atomoxetin ikke er forsøgt. | | | | |
| Kommentarer | Forskellige formuleringer. | Prodrug, som i blodet omdannes til dexamfetamin. | Godkendt til børn og unge (6-17 år, ikke voksne). | Noradrenalin Reuptake Inhibitor (NRI). | Godkendt til børn og unge (6-17 år, ikke voksne). |
| Effekt ved opstart | Samme dag | | | I løbet af 2-6 uger | |
| Udvalgte bivirkninger | Nedsat appetit, mundtørhed, søvnforstyrrelse, øget puls, øget blodtryk, erektil dysfunktion og nedsat libido. | | | Kvalme, mundtørhed, nedsat appetit, erektil dysfunktion, ejakulatorisk dysfunktion, søvnforstyrrelse, øget blodtryk og øget puls. | Døsighed, tørst, hypotension, forstoppelse, bradykardi, søvnforstyrrelse og vægtøgning. |
| Virkningsvarighed | 3-12 timer (se bagside) | 10-14 timer | 4-6 timer | Døgndækning | |
| Godkendt daglig maxdosis | 6-17 år: 60 mg Voksne: 80 mg | 70 mg | 20 mg, undtagelsesvist 40 mg | 100 mg | 6-12 år: 4 mg 13-17 år: 7 mg |
| Seponering | Kan seponeres brat | | | Overvej aftrapning ved doser > 80 mg | Aftrappes Blodtryk og puls overvåges |
| Prisinterval pr. år* | 1.200 - 7.900 kr.* | 12.200-13.000 kr. * | 3.800-14.300 kr. * | 1.300-7.400 kr. * | 11.500-17.200 kr.* |

§ Centralstimulerende lægemidler er omfattet af "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler", og patienter skal tilses mindst hvert ½ år.

*Forbrugspris pr. styrke i Region Hovedstaden oktober 2025 - marts 2026. 1 tbl. dgl. bortset fra dexamfetamin og methylphenidat tabletter, hvor der er beregnet 2 tbl. dgl.

Methylphenidat præparater

| Navn | Styrker | Virkningsvarighed | Godkendt til | Prisinterval pr. år* | Noter |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|---|
| Tabletter – alle kan substitueres på apoteket | | | | | |
| Medanef, Medikinet tabletter, Motiron, Ritalin tabletter | 5, 10, 20 mg | 3-4 timer | 6-17 år | 1.500 - 4.600 kr.* | 10 mg findes som 100 stk. Må knuses. |
| Depottabletter – alle kan substitueres på apoteket | | | | | |
| Concerta, Methylphenidat depottabletter | 18, 27, 36, 54 mg | 12 timer | Fra 6 år | 1.200-3.900 kr.* | 18, 36 og 54 mg findes som 90/100 stk. Må ikke deles/knuses/tygges. Langsom frigivelse. |
| Kapsler med modificeret udløsning – ingen automatisk substitution på apoteket mellem de tre grupper | | | | | |
| Equasym Depot, Equasym XL | 10, 20, 30 mg | 8 timer | 6-17 år | 4.900-5.900 kr.* | Må åbnes og opslemmes. Efterligner en normal tablet og derefter en depottablet. |
| Medikinet Retard, Medikinet CR | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg | 8 timer | Fra 6 år | 1.700-7.900 kr.* | Må åbnes og opslemmes. Efterligner to normale tabletter givet med 3-4 timers mellemrum. |
| Ritalin Uno, Metyrol, Methylphenidat kapsler med modificeret udløsning | 10, 20, 30, 40, 60 mg | 8 timer | Fra 6 år | 1.700-5.000 kr.* | Må åbnes og opslemmes i sure fødevarer. Efterligner to normale tabletter givet med 3-4 timers mellemrum. |


* Forbrugspris pr. styrke i Region Hovedstaden oktober 2025 - marts 2026. 1 tbl. dgl. bortset fra tabletter hvor der er beregnet 2 tbl. dgl.

Seponering

Vurdér om patientens ønsker og behov for medicin har ændret sig

- Evaluér resultatet af dosisreduktion eller seponering efter 1 måned for at skelne mellem seponeringssymptomer og tilbagevendende ADHD-symptomer (relaps).
- Behandlingen kan genoptages ved relaps, hvis patienten ønsker dette.

Effekt årligt – inspiration til samtalen



Bivirkninger årligt



Puls



Blodtryk

Dansk Cardiologisk Selskab anbefaler ikke at man tager EKG på baggrund af ADHD medicin.



Vægt