

Oversigt over antitrombotisk behandling ved udvalgte indikationer



Diagnose	Underdiagnose	Antitrombotika-virksomt stof	Præparatnavn	Stoftype	Dosis (reduceret dosis)	OBS	Pris per døgn i kr. ■
Atrieflimren	Valvulær	Warfarin	Marevan, Warfarin 'Orion'	Vitamin K Antagonist (VKA)	Variabel	• TTI ≥ 70% (tid i terapeutisk INR-interval)	1,37 - 5,48
	Non-valvulær	★ Rivaroxaban	fx Xarelto	Faktor Xa Antagonist	20 mg x 1 (15 mg x 1)	• Skal tages med mad, da det øger absorptionen • Kontraindiceret ved eGFR < 15 ml/min • + dosisdispensering	16,27 (16,06)
		★ Dabigatranetexilat	fx Pradaxa	Faktor IIa (=trombin) Antagonist	150 mg x 2 (110 mg x 2)*	• Kontraindiceret ved eGFR < 30 ml/min • Skal opbevares i original emballage. Må ikke dosisdispenseres.	3,66 (3,20)
		Edoxaban	Lixiana	Faktor Xa Antagonist	60 mg x 1 (30 mg x 1)**	• Ved eGFR > 90 ml/min kan effekten være nedsat • Kontraindiceret ved eGFR < 15 ml/min • + dosisdispensering	18,09 (16,32)
		Apixaban	Eliquis	Faktor Xa Antagonist	5 mg x 2 (2,5 mg x 2)***	• Kontraindiceret ved eGFR < 15 ml/min • + dosisdispensering	20,22 (20,72)
		Warfarin	Marevan, Warfarin 'Orion'	Vitamin K Antagonist (VKA)	Variabel	• TTI ≥ 70% (tid i terapeutisk INR-interval: 2,0 – 3,0)	1,37 - 5,48
DVT + LE		Rivaroxaban	fx Xarelto	Faktor Xa Antagonist	15 mg x 2 i 3 uger, derpå 20 mg x 1 (15 mg x 1)	• Skal tages med mad, da det øger absorptionen • Kontraindiceret ved eGFR < 15 ml/min • + dosisdispensering	16,27 (16,06)
		Dabigatranetexilat	fx Pradaxa	Faktor IIa (=trombin) Antagonist	150 mg x 2 (110 mg x 2)*	• Start af behandling skal forudgås af ≥ 5 dages parenteral AK-behandling • Kontraindiceret ved eGFR < 30 ml/min • Opbevares i original emballage. Må ikke dosisdispenseres.	3,66 (3,20)
		Edoxaban	Lixiana	Faktor Xa Antagonist	60 mg x 1 (30 mg x 1)**	• Start af behandling skal forudgås af ≥ 5 dages parenteral AK-behandling • Kontraindiceret ved eGFR < 15 ml/min • + dosisdispensering	18,09 (16,32)
		Apixaban	Eliquis	Faktor Xa Antagonist	10 mg x 2 i 1 uge, derpå 5 mg x 2 (2,5 mg x 2)***	• Kontraindiceret ved eGFR < 15 ml/min • + dosisdispensering	20,22 (20,72)
		Warfarin	Marevan, Warfarin 'Orion'	Vitamin K Antagonist (VKA)	Variabel	• TTI ≥ 70% (tid i terapeutisk INR-interval: 2,0 – 3,0)	1,37 - 5,48

Diagnose	Underdiagnose	Antitrombotika-virksomt stof	Præparatnavn	Stoftype	Dosis (reduceret dosis)	OBS	Pris per døgn i kr. ■
AKS	(ticagrelor, prasugrel eller clopidogrel gives ét år sammen med ASA, der efterfølgende gives livslangt i monoterapi) Behandlingsvarigheden af ticagrelor i tillæg til ASA kan evt. forlænges op til 36 måneder ud over de første 12 måneder efter grundig vurdering af patientens blødnings- og tromboserisiko. Ved fortsættelse udover de første 12 mdr. reduceres ticagrelor dosis til 60 mg x 2 dgl. Beslutningen om fortsat behandling udover 1 år skal tages af en speciallæge i kardiologi.	Acetylsalicylsyre	Fx Hjerdyt	Trombocythæmmer	75 mg x 1	• Livslang behandling. Tåles ASA ikke, gives clopidogrel	0,67
		Ticagrelor	Brilique	Trombocythæmmer	90 mg x 2 (60 mg x 2)	• Seponeres 1 år efter AKS	28,80 (20,20)
		Prasugrel	Efient	Trombocythæmmer	10 mg x 1 (5 mg x 1)	• Seponeres 1 år efter AKS	4,91 (1,65)
		Clopidogrel	Fx Clopidogrel	Trombocythæmmer	75 mg x 1	• Seponeres 1 år efter AKS	1,00
Kronisk koronart syndrom (iskæmisk hjerte-sygdom)♦	Uden PCI	★ Acetylsalicylsyre	Fx Hjerdyt	Trombocythæmmer	75 mg x 1	• Livslang behandling. Tåles ASA ikke, gives clopidogrel	0,67
		★ Clopidogrel	Fx Clopidogrel	Trombocythæmmer	75 mg x 1	• Livslang behandling, hvis ASA ikke tåles	1,00
	Efter PCI (Clopidogrel gives ½ år sammen med ASA, som efterfølgende gives livslangt i monoterapi)	★ Acetylsalicylsyre	Fx Hjerdyt	Trombocythæmmer	75 mg x 1	• Livslang behandling. Tåles ASA ikke, gives clopidogrel	0,67
		★ Clopidogrel	Fx Clopidogrel	Trombocythæmmer	75 mg x 1	• Seponeres efter ½ år. Livslang behandling, hvis ASA ikke tåles	1,00
Cerebralt infarkt og TCI	På aterosklerotisk basis	★ Clopidogrel	Fx Clopidogrel	Trombocythæmmer	75 mg x 1	• Livslangt	1,00
		Dipyridamol / Acetylsalicylsyre	Orisantin	Trombocythæmmer	200 mg/ 25 mg x 2	• Livslangt	4,60
	Kardioemboli ved non-valvulær AFLI					• Behandles som non-valvulær atrieflimren	

★ Basislistens rekommandationer.

Doser i parentes (...) angiver den anbefalede reducerede dosis.

* ≥80 år eller samtidig behandling med verapamil. Ved AF kan dosisreduktion ligeledes overvejes ved høj blødningsrisiko (og lav tromboembolisk risiko), eller eGFR 30-50 ml/min.

** Hvis ét af følgende kriterier er opfyldt: eGFR 15-50 ml/min, ≤60 kg, eller ved samtidig behandling med perorale svampemidler fx ketoconazol.

*** eGFR 15-29 ml/min eller to af følgende kriterier opfyldt: ≥80 år, ≤60 kg, kreatinin >133 µmol/L.

■ Pris/døgn for vedligeholdelsesdosis beregnet ud fra billigste pakning svarende til 3 måneders forbrug eller herunder. Warfarins pris er angivet ud fra et dosisinterval på 2,5-7,5 mg/døgn. www.medicinpriser.dk pr. 28-04-2025.

♦ Patienter med kronisk koronart syndrom, som får AKS, behandles som beskrevet under AKS i 12 mdr. med dual trombocythæmning. Herefter gives kun ASA (alternativt gives clopidogrel, hvis ASA ikke tåles).

Patienter med flere af ovennævnte diagnoser og behov for kombinationsbehandling: Se nbv.cardio.dk