


Algoritme for valg af antidiabetika til type-2 diabetes patienter uden samtidig hjerte- og nyresygdom



¹ Kardiiovaskulære risikofaktorer: Alder > 60 år; Mandligt køn; Familiær disposition til tidlig debut af kardiiovaskulær sygdom (<55 år for mænd, < 65 år for kvinder); Dysreguleret hypertension > 130/80 mmHg trods behandling; Dyslipidæmi > 1,8 mmol/l trods behandling; Rygning 10 pakkeår.

² For forslag til intensiveret behandling henvises til National behandlingsvejledning for type 2 diabetes (2022). Dansk Endokrinologisk selskab.

KILDE: Medicinrådets behandlingsvejledning og lægemiddelrekommendation om Type 2-diabetes, Pro.medicin.dk, DES/DSAM Farmakologisk behandling af type 2-diabetes (2022), Den National Rekommandationsliste (NRL) Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes vers. 2.0.

Hovedbudskaber

- Metformin er fortsat basisbehandling til patienter uden komorbiditet
- Ved 3 risikofaktorer for hjertekarsygdom, vælg SGLT-2-hæmmer fx lardiance eller Invokana, før GLP-1 analog
- Øvrige tillæg af antidiabetika individualiseres mhp. at regulere HbA1c.