

Børnedoseringer ved flydende lægemidler til oralt brug

Doseringerne er i ml per døgn

	Styrke	Døgndosis	ml per døgn												Fordeles på antal doser
			5 kg	6 kg		7 kg	8 kg	10 kg	12 kg	15 kg	18 kg	20 kg	25 kg	30 kg	
Penicillin V															
Primve	50 mg/ml	50 mg/kg	5	6		7	8	10	12	15	18	20	25	30	3
Phenoxymethylpenicillin	50 mg/ml	50 mg/kg	5	6		7	8	10	12	15	18	20	25	30	
Primcillin®	50 mg/ml	50 mg/kg	5	6		7	8	10	12	15	18	20	25	30	
Amoxicillin															
Imaxi	50 mg/ml	50 mg/kg ³	5	6		7	8	10	12	15	18	20	25	30	3
Imacillin ¹	50 mg/ml	50 mg/kg ³	5	6		7	8	10	12	15	18	20	25	30	
Amoxicillin m. clavulansyre ¹															
Spektramox	50/12,5 mg/ml	50/12,5 mg/kg	5	6		7	8	10	12	15	18	20	25	30	3
Augmentin Forte	50/12,5 mg/ml	50/12,5 mg/kg	5	6		7	8	10	12	15	18	20	25	30	
Clarithromycin ²															
Klacid®	25 mg/ml	15 mg/kg	3	4		4,5	5	6	7,5	-	-	-	-	-	2
Klacid®	50 mg/ml	15 mg/kg	-	-		-	-	3	3,5	4,5	5,5	6	8	9	
Trimethoprim															
Trimopan®	10 mg/ml	6 mg/kg	3	4		4,5	5	6	7,5	9	11	12	15	18	2

¹ Børn > 1 måned og < 40 kg.

² Ved dosering af clarithromycin til 10 kg og 12 kg anvendes enten Klacid® (clarithromycin) 25 mg/ml eller 50 mg/ml.

³ Dog højst 3.000 mg pr. døgn.



Udarbejdet august 2025. Fra "infektioner i almen praksis. Undersøgelse og behandling – en kort vejledning", Version 6.4

